

DEVOIR SURVEILLE N° 3 (a)

Le barème est seulement donné à titre indicatif, il n'est pas définitif

Exercice 1 : Questions de cours (sur 1,5 point)


- (a) Donner la définition de deux événements disjoints.
(b) Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en justifiant vos réponses :
 - Si A et B sont deux événements alors $(A \cap B) \subset (A \cup B)$
 - Deux événements incompatibles sont des événements contraires.
- Traduire par une égalité vectorielle les affirmations suivantes :
 - $EFGH$ est un parallélogramme.
 - I est le milieu de $[AB]$.
 - S est l'image de R par la translation de vecteur \vec{u} .

Exercice 2 : Vecteurs et construction (sur 2,5 points)

On considère les points A et C ainsi que les vecteurs \vec{u} , \vec{v} et \vec{w} représentés ci-dessous ; les vecteurs \vec{v} et \vec{w} ont la même direction.

Faire les constructions suivantes sur la feuille de l'énoncé (les tracés doivent être clairs, utiliser des couleurs et laisser les traits de construction).

- Construire un représentant du vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ et un représentant du vecteur $\vec{u} - \vec{v}$.
- Construire B , l'image de A par la translation de vecteur $(-\vec{u})$.
- Construire un représentant du vecteur $\vec{v} - \vec{w}$.
- Construire le point D tel que $\overrightarrow{CD} = \vec{v} + \vec{w}$.
- Représenter l'ensemble des points M tels que $AM = CM$ (justifier).



Exercice 3 : Calcul littéral (sur 6,5 points)

On considère la fonction f définie par $f(x) = (3x - 5)^2 - 4x^2$.

- Développer $f(x)$.
- Factoriser $f(x)$.
- Démontrer que $f(x) = 5(x - 3)^2 - 20$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- En utilisant la forme la plus adaptée de $f(x)$, répondre aux questions suivantes :
 - Quelle est l'ordonnée du point de \mathcal{C}_f dont l'abscisse vaut $\sqrt{2}$?
 - Montrer que -20 est le minimum de f . En quel nombre est-il atteint ?
 - Résoudre $f(x) = x - 1$.
 - Déterminer les antécédents de 25 par f .
- On considère l'équation (E) : $\frac{3}{2} - \frac{2x}{3x - 5} = \frac{5}{2x}$.
 - Montrer que l'équation (E) équivaut à : $\frac{f(x)}{2x(3x - 5)} = 0$.
 - En déduire la résolution de (E).


Exercice 4 : QCM (sur 2,5 points)

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chacune des quatre questions posées, 4 propositions sont données dont une seule est exacte. Vous devez écrire sur votre copie le numéro de la question associée à la lettre donnant l'affirmation exacte. Aucune justification n'est demandée mais toute réponse inexacte sera pénalisée par des points négatifs. Une absence de réponse n'apporte et ne retire aucun point.

- On choisit au hasard un nombre de deux chiffres ne commençant pas par 0. On considère les événements suivants : A : "les deux chiffres du nombre choisi sont identiques"; B : "le nombre choisi est un multiple de 10"; C : "le nombre choisi est pair".
 - L'univers est $\Omega = [10; 99]$
 - $C \subset B$
 - A et B sont incompatibles
 - $A \cup C = \{22; 44; 66; 88\}$
- L'équation $\frac{x^2 - 1}{x - 1} = 0$
 - admet le nombre -1 comme unique solution
 - a le même ensemble de solutions que $x^2 - 1 = 0$
 - n'admet pas de solution
 - équivaut à $x^2 - 1 = 0$ ou $x - 1 = 0$
- Dans une urne, se trouvent 5 cartons et sur chacun d'entre eux figure une lettre du mot MATHS. On tire un carton au hasard dans l'urne et on considère les événements E : "on a tiré une voyelle" et $F = \{M; T; H\}$.
 - E et F sont contraires
 - $E \cap F$ est un événement élémentaire
 - $\bar{F} \subset E$
 - $\bar{E} \cup F = \bar{E}$

- On considère la figure ci-contre .

- $\vec{CD} + \vec{CB} = \vec{BD}$
- $\vec{PN} - \vec{PQ} = \vec{0}$
- $\vec{ED} - \vec{DB} + \vec{DC} = \vec{AC}$
- $\vec{ME} - \vec{EN} + \vec{PD} = \vec{MI}$



Exercice 5 : Géométrie analytique et vecteurs (sur 7 points)

On considère les points $A\left(2; \frac{5}{2}\right)$, $B\left(6; \frac{9}{2}\right)$ et $C\left(3; \frac{3}{2}\right)$ dans un repère orthonormé $(O; I; J)$. On note \mathcal{C} le cercle circonscrit au triangle ABC .

1. Faire une figure que vous complèterez tout au long de l'exercice.
2. Démontrer que ABC est un triangle rectangle.
3. Déterminer les coordonnées du centre E de \mathcal{C} ainsi que son rayon r . Justifier votre réponse.

On appelle D le point d'intersection entre la médiatrice de $[AB]$ et le cercle \mathcal{C} dont l'abscisse vaut 5 et on considère le point F défini par $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{ED}$.

4. Quelle est la nature de $ADBF$? Justifier.
5. Déterminer par un calcul tous les points de \mathcal{C} qui ont pour ordonnée $\frac{11}{2}$.
6. Soit K le point défini par $\overrightarrow{AK} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB}$.
 - (a) Justifier que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BK}$.
 - (b) Ecrire la somme suivante sous forme d'un seul vecteur : $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{DA}$ en justifiant.